

Formülü:

Diclofenac sodium, 100 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Difenak enterik tablet analjezik antipiretik ve antiinflamatuvar özellikleri ile başlıca;

- Romatoid artrit, dejeneratif eklem hastalığı dahil olmak üzere ciddi osteoartrit vakaları, Ankiloz spondilit, Lombalji, tendinit, tenosinovit, bursit ve diğer romatoid hastalıkların Travma ve operasyon sonrası enfalamasyona bağlı ödemli ağrılı durumların, Burkulma ve incinme gibi akut kas-iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde
- Ayrıca dismenore gibi jinekolojik ağrılı inflamasyonlu durumlarda kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Aktif peptik ülser, gastrit, bölgesel enterit veya ülseratif gibi gastrointestinal sisteme ait inflamasyonlu durumlarda veya daha önce bu hastalıkları geçirmiş olanlarda, karaciğer fonksiyon bozukluklarında dikkatli kullanılmalıdır. Diklofenak sodyum asetil salisilik asid sodyum ve asetil salisilik asid (ASA) veya diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlara karşı allerjik reaksiyon gösteren hastalarda ve astımda kullanılmaz.

Uyarılar/Önlemler:

- ASA çapraz duyarlılık gösterir. ASA ve diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlara hassas olan kişilere verilmemelidir.

- Hamilelik ve laktasyon döneminde güvenli kullanımı tespit edilmemiş olduğundan bu durumlarda kullanılması tavsiye edilmez.

- Yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

- Geçmişte renal hepatik veya kardiyak yetmezlik geçirmiş olan hastalarda ve koagülasyon bozukluklarında dikkatli kullanılmalıdır.

- Epilepsi, Parkinson veya psikozlu hastalarda Difenak enterik tablet kullanılırken özel dikkat gösterilmelidir.

- Diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile birlikte kullanıldığı takdirde hemoraji ve ülser riski artar.

- Uzun süreli tedavilerde periyodik olarak kan testleri, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının kontrolü yapılmalıdır.

- Hepatik porfirili hastalarda krizlerin başlamasına neden olabilir.

- Tedavi süresince baş dönmesi ve ışığa hassasiyet oluşabileceğinde, motorlu taşıt kullanırken dikkatli olunmalıdır.

-

Yan etkiler/Advers etkiler:

Gastrointestinal rahatsızlıkları (gastrik veya abdominal ağrı, mide bulantısı, kusma iştahsızlık, kabızlık ve diyare peptik ülser) neden olabilir. Bazı nadir vakalarda gastrointestinal ülserasyon ve kanamaya yol açabilir. Bu takdirde tedavi dural durdurulmalıdır. Difenak enterik tablet tedavisi sırasında baş dönmesi, baş ağrısı, kırıklık, konsantrasyon bozukluğu, yorgunluk, ışığa hassasiyet gibi santral sinir sistemi ile ilgili yan etkilere rastlanabilir. Bazı vakalarda karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında anormallikler, çarpıntı ve aritmiye rastlanabilir. Asetilsalisilik aside karşı duyarlı hastalarda astım ortaya çıkabilir.

İlaç etkileşimleri:

- Asetilsalisilik asid ile birlikte alındığında serum seviyeleri karşılıklı olarak düşer.

- Metotraksatin hematolojik toksisitesini potansiyalize eder.

- Digoksinin plazma konsantrasyonu yükselir.

- Oral hipoglisemik veya antikoagulan ilaçların etkisini artırabilir.

- Diüretiklerin etkisini azaltabilir.

- Tiklopidin ile aditif etki gösterir.

- Sülfamidlerin hipoglisemik etkilerini artırabilir.

- Diüretiklerin etkisini azaltabilir.

- Tiklopidin ile aditif etki gösterir.

- Sülfamidlerin hipoglisemik etkilerini artırabilir.

- Lityumun plazma konsantrasyonunu artırır.

Kullanım şekli ve dozu:

Günde bir defa yemekten sonra alınır. Tabletler su ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

<http://www.ilacprospektusu.com/ilac/173/difenak-100-mg-10-tablet>